

La conjecture de Collatz a été découverte par ce dernier dans les années vingt du 20<sup>e</sup> siècle. Elle était en ce moment là appelé « problème  $3x+1$  » ; elle a pris d'autres noms parmi autres la suite de Collatz qui se définit simplement comme suit :

$\forall x \in \mathbb{N}^*$ , partant de  $x$  ; s'il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 ( $3x+1$ ) ; s'il est pair on le divise par 2 ( $x/2$ ) ; si on répète la transformation, on finit par tomber sur 1 qui suit son « vol » infiniment dans le cycle trivial, c'est-à-dire 1, puis 4, puis 2, puis encore 1, ainsi de suite.

Depuis on a cessé d'utiliser l'informatique pour marquer des records de  $x$  grand,  $\in \mathbb{N}^*$  qui permettent de rechercher un hypothétique contre exemple . Le projet «  $3x+1@home$  » entend s'attaquer à toutes les suites de Collatz comprises entre  $2^{71}$  et  $2^{72}$ . Jusqu'à peu près cette limite, la conjecture est vérifiée.

Je crois que si on vérifie les trois étapes suivantes, on peut démontrer la conjecture à savoir :

- 1)-  $\exists!$  Cycle dans la suite de Collatz, c'est le cycle trivial 4-2-1
- 2)-  $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , la suite de Collatz décroît vers un  $n' / n' < n$
- 3)-  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ , la suite de Collatz, atterrit dans le cycle trivial dont 1, est le plus petit Élément.

### 1)- $\exists!$ Cycle dans la suite de Collatz, c'est le cycle trivial 4-2-1

PROPOSITION I :

$\forall n \in \mathbb{N}^*$  ;  $\forall$  le cycle de la suite de Collatz défini sur  $n$ , son plus petit élément est toujours Impair.

Démonstration : soit  $m$  le plus petit élément du cycle  $C$  ;  $C$  étant la trajectoire de  $m$ . Soit  $m'$  le nombre qui suit  $m$ , dont il est issu

Alors  $m'$  est aussi dans la trajectoire  $m$  ;  $m' > m$ , puisque  $m$  est le plus petit élément d'après notre proposition . Si  $m$  est pair  $\Rightarrow m' = m/2 \Rightarrow m > m'$  ce qui est absurde, donc  $m$  est impair et  $m' = 3m + 1$  avec  $m$  toujours  $< m'$ . **CQFD.**

Partant de notre proposition I, soit un cycle de longueur  $k = 3$  dans  $\mathbb{N}^*$ . On notera ses  $k$  éléments distincts deux à deux  $a_1, a_2, a_3$ .

Supposant que le plus petit des éléments est  $a_3$ . Alors  $a_3$  est forcément impair, et en

particulier  $a_1 = 3a_3 + 1$ .  $a_2$  devra être  $> a_3 \Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2}$

Si  $a_1$  est impair  $\Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{3a_3 + 1}{2} \Rightarrow a_1 = \frac{2a_2}{1} \Rightarrow a_1 = \frac{2(3a_3 + 1)}{2} \Rightarrow a_1 = 3a_3 + 1 \Rightarrow a_1 < a_3$

Absurde, donc  $a_1$  est pair  $\Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2}$

Arrivant au calcul du Produit  $P$ , des termes du cycle :

$$P = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \quad \text{remplaçant par leurs valeurs calculées,}$$

$$P = (3a_3+1) \cdot a_1/2 \cdot a_2/2 \quad \text{établissant l'équation associée au produit des termes du cycle.}$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = (3a_3+1) \cdot a_1/2 \cdot a_2/2$$

$$\Rightarrow a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = \frac{(3a_3+1) \cdot a_1 \cdot a_2}{4}$$

$$\Rightarrow 4(a_1 \cdot a_2 \cdot a_3) = (3a_3+1) \cdot a_1 \cdot a_2$$

$\Rightarrow 4 = \left(3 + \frac{1}{a_3}\right)$  : l'équation sous sa forme épurée admet comme solution  $a_3 = 1$  ( $4=4$ ), donc  $a_2 = 2$ ,  $a_3 = 2$  et  $a_1 = 3 \cdot a_3 + 1 = 4$ , l'équation associée au cycle trivial  $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Existent-ils d'autres  $x_1, x_2, x_3$  définis dans  $\mathbb{N}^*$ , qui forment un autre cycle avec  $k=3$  ?

Nous avons 3 nombres  $x_1, x_2$  et  $x_3$  avec chacun 2 façons de se présenter, s'il est pair, soit en  $(x/2)$  dite  $a$ , soit en  $(3x+1)$  dite  $b$  s'il est impair, donc nous avons  $2^3 = 8$  cas possibles que nous allons examiner en permutant les opérations  $a$  et  $b$  par 3 :

$$\text{-1) cas : } a \ a \ a \Rightarrow ((x/2)/2) / 2 = x \Rightarrow x = 0$$

(Après 3 opérations, il retourne à  $x$  puisque c'est un cycle, donc  $= x$ )

$$\text{-2) cas : } a \ a \ b \Rightarrow 3((x/2)/2) + 1 = x \Rightarrow x = 4$$

$$\text{-3) cas : } a \ b \ a \Rightarrow ((3x+1)/2)/2 = x \Rightarrow x = 1$$

$$\text{-4) cas : } a \ b \ b \Rightarrow (3(3x+1)+1)/2 = x \Rightarrow x = -4/7$$

$$\text{-5) cas : } b \ b \ b \Rightarrow 3(3(3(x+1) + 1) + 1) = x \Rightarrow x = -1/2$$

$$\text{-6) cas : } b \ a \ b \Rightarrow 3((3x+1)/2)+1 = x \Rightarrow x = -5/7$$

$$\text{-7) cas : } b \ b \ a \Rightarrow 3(3(x/2)+1)+1 = x \Rightarrow x = -8/7$$

$$\text{-8) cas : } b \ a \ a \Rightarrow (3(x/2) + 1) / 2 = x \Rightarrow x = 2$$

Les seules solutions de nos équations dans  $\mathbb{N}^*$  sont  $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$  qui sont celles du cycle trivial  $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$  ; les autres solutions  $(0, -4/7, -1/2, -5/7, -8/7)$  n'appartiennent pas à  $\mathbb{N}^*$

#### PROPOSITION II

$\forall n \in \mathbb{N}^*$  définissant la suite de Collatz  $\exists!$  cycle de longueur  $k=3$ ,  
c'est le cycle trivial  $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ .

**CQFD**

Cas si la longueur du cycle  $k > 3$  :

Supposons qu'il existe un cycle de la suite de Collatz de longueur  $k > 3$ ,  $a_1$  étant le plus petit élément, défini par les termes suivants:

$$c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_k \quad [1]$$

Pour opérer les calculs selon la suite de Collatz sur les termes  $c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_k$  Nous devrions connaître leur parité. Or tout ce que nous savons par notre proposition I ci-dessus, c'est que  $c_1$ , le plus petit élément est impair. Quant aux autres termes, soit en procédant théoriquement par un tri des termes du cycle suivant la parité ; indépendamment de l'indice et de sa position exacte dans la suite, puisqu'on l'ignore.

Nous posons ensuite le produit de ces  $k$  termes, qu'on appellera  $P$ . (la commutativité du produit nous dispense de la position des vrais indices du cycle)

En posant d'abord, en les triant par parité, puis en spécifiant les termes impairs par  $a$ , les termes pairs par  $b$  ; puis en désignant par  $m$  le nombre de termes (ou cardinal) impairs, et  $h$  le nombre de termes pairs (  $m \& h \in \mathbb{N}^*$  )

On obtient

$$P = a_1. a_2 \dots a_m . b_1. b_2 \dots b_h \quad [2]$$

Exprimant maintenant chaque terme par sa valeur puisque nous avons défini sa parité en le multipliant par  $3x+1$  s'il est impair et en le multipliant par  $x/2$  s'il est pair :

$$P = (3a_1+1). (3a_2+1) \dots (3a_m+1). (b_1)/2. (b_2)/2 \dots (b_h)/2. \quad [3]$$

Soit l'équation qui relie les deux formes du produit sous sa forme brute :

$$a_1. a_2 \dots a_m . b_1. b_2 \dots b_h = (3a_1+1). (3a_2+1) \dots (3a_m+1). (b_1)/2. (b_2)/2 \dots (b_h)/2.$$

Simplifions l'équation par :

$$(a_1. a_2 \dots a_m). (b_1. b_2 \dots b_h) = \frac{(3a_1+1).(3a_2+1) \dots (3a_m+1). (b_1).(b_2) \dots (b_h)}{2^h}$$

$$\Rightarrow 2^h . (a_1. a_2 \dots a_m). (b_1. b_2 \dots b_h) = (3a_1+1) \dots (3a_m+1). (b_1). (b_2) \dots (b_h)$$

$$\Rightarrow 2^h (a_1. a_2 \dots a_m) = (3a_1+1). (3a_2+1) \dots (3a_m+1)$$

$$2^h = \frac{(3a_1+1)}{a_1} . \frac{(3a_2+1)}{a_2} \dots \frac{(3a_m+1)}{a_m}$$

$$2^h = \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) . \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right) \quad [4]$$

Intéressons nous un instant au terme de droite que l'on nomme  $D$ .

4/19

$$2^h = \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right)$$

Vérifions l'équation avec  $3^m$ , borne minimale de  $D \iff 3^m < D$

Sachant que  $D > 3^m$ , par :  $2^h < 3^m < D \Rightarrow 2^h < 3^m$  ou  $3^m < 2^h < D \Rightarrow 2^h > 3^m$

Selon  $h$  et  $m$ , trois cas peuvent se présenter :

1) - si  $m=h$  ,  $2^h < 3^m \Rightarrow h \cdot \log 2 < m \cdot \log 3 \Rightarrow \frac{h \cdot \log 2}{h \cdot \log 3} < \frac{m \cdot \log 3}{h \cdot \log 3}$

$\Rightarrow \frac{m}{h} > \frac{\log 2}{\log 3}$ , comme  $\frac{m}{h} = 1, \Rightarrow 1 > \frac{\log 2}{\log 3}$  ce qui est évident

2) - si  $m > h$ ,  $2^h < 3^m \Rightarrow h \cdot \log 2 < m \cdot \log 3 \Rightarrow \frac{h \cdot \log 2}{h \cdot \log 3} < \frac{m \cdot \log 3}{h \cdot \log 3} \Rightarrow \frac{m}{h} > \frac{\log 2}{\log 3}$

Comme  $m > h \Rightarrow \frac{m}{h} > 1 \Rightarrow \frac{m}{h} > \frac{\log 2}{\log 3}$ , ce qui est évident

3) - si  $m < h$  : la solution n'est pas évidente, comme  $m < h$ , il se peut que  $\frac{m}{h}$  soit  $= \frac{\log 2}{\log 3}$

Or nous avons :

a) soit  $2^h < 3^m \Rightarrow h \cdot \log 2 < m \cdot \log 3 \Rightarrow \frac{h \cdot \log 2}{h \cdot \log 3} < \frac{m \cdot \log 3}{h \cdot \log 3} \Rightarrow \frac{m}{h} > \frac{\log 2}{\log 3}$ , ex  $2^4 < 3^3$

Ou bien

b) soit  $2^h > 3^m \Rightarrow h \cdot \log 2 > m \cdot \log 3 \Rightarrow \frac{h \cdot \log 2}{h \cdot \log 3} > \frac{m \cdot \log 3}{h \cdot \log 3} \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}$ , ex  $2^7 > 3^4$  [5]

Or nous avons  $2^h < 3^m \Rightarrow \frac{m}{h} > \frac{\log 2}{\log 3} \iff 2^h > 3^m \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}$  [6] ; cette équivalence logique est dû,

si on multiplie ou divise les 2 membres d'une inéquation par une même valeur strictement négative (ex : -1), le sens de l'inéquation change tandis que les solutions de l'inéquation restent les mêmes.

Il suffit donc de démontrer, si  $m < h$ , l'une des cas en a) ou en b) par la transformation de Collatz et d'en tirer les conclusions

Démontrons alors cette inégalité  $\frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}$  :

Si le vol N atterrit en 1 alors le nombre **h** d'étapes paires du vol N et

5/19

Le nombre **m** d'étapes impaires du vol N vérifient

$$\frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \quad \text{:Démonstration}$$

Soit  $N = U(0), U(1), \dots, U(p)=1$  le vol N

Posons la suite de simplification pour  $N = \left(\frac{U(0)}{U(1)}\right) \cdot \left(\frac{U(1)}{U(2)}\right) \cdot \left(\frac{U(2)}{U(3)}\right) \dots \left(\frac{U(p-1)}{U(p)}\right)$

$$\text{Donc } \log N = \log \left(\frac{U(0)}{U(1)}\right) + \log \left(\frac{U(1)}{U(2)}\right) + \log \left(\frac{U(2)}{U(3)}\right) \dots + \log \left(\frac{U(p-1)}{U(p)}\right)$$

Lorsque  $i$  est une étape paire on a :  $\log \left(\frac{U(i)}{U(i+1)}\right) = \log \left(\frac{U(i)}{U(i)*2}\right) = \log 2$

Lorsque  $i$  est une étape impaire on a :

$$\log \left(\frac{U(i)}{U(i+1)}\right) = \log \left(\frac{U(i)}{3*U(i)+1}\right) = \log \left(\frac{1}{3+\frac{1}{U(i)}}\right) = -\log \left(3 + \frac{1}{U(i)}\right)$$

$$\Rightarrow \log N = h \cdot \log(2) + m \cdot \log \left(\frac{1}{3+\frac{1}{U(i)}}\right)$$

$$\Rightarrow \log N = h \cdot \log(2) + (-m \cdot \log \left(3 + \frac{1}{U(i)}\right)) \quad (1)$$

Avec  $U(i)$  grand  $\Rightarrow \frac{1}{U(i)} \approx 0$ , prenant seulement la borne minimale  $\log(3)$  sans les  $\frac{1}{am}$

puisque  $h \cdot \log(2) - m \cdot \log \left(3 + \frac{1}{U(i)}\right) < h \cdot \log(2) - m \cdot \log(3)$  ; l'équation (1) devient donc :

$$0 < \log N < h \cdot \log(2) - m \cdot \log(3)$$

$$\Rightarrow 0 < h \cdot \log(2) - m \cdot \log(3)$$

$$\Rightarrow m \cdot \log(3) < h \cdot \log(2) \quad , \text{ divisons les 2 parties de l'inéquation par } h \cdot \log(3)$$

$$\text{D'où } \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}$$

Comme dans [6] nous avons vérifié que  $2^h > 3^m \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}$  , on peut conclure par la proposition suivante :

PROPOSITION III :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* ; \text{ la suite de Collatz atterrit de } n \text{ vers } 1 \Rightarrow ( 2^h > 3^m \text{ et } \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} ) \quad [7]$$

Vérifiant l'implication réciproque de cette proposition III :

Soit  $C = \langle \forall n \in \mathbb{N}^* ; \text{ la suite de Collatz atterrit de } n \text{ vers } 1 \rangle$

Soit  $A = \langle 2^h > 3^m \rangle$

Soit  $B = \langle \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \rangle$

Nous avons l'implication  $C \Rightarrow (A \wedge B)$ , et sa réciproque  $(A \wedge B) \Rightarrow C$

6/19

$$\begin{aligned} (A \wedge B) \Rightarrow C &\equiv \neg C \Rightarrow \neg(A \wedge B) \\ &\equiv \neg C \Rightarrow \neg A \vee \neg B \\ (A \wedge B) \Rightarrow C &\equiv \neg C \Rightarrow \neg A \end{aligned}$$

Démontrons alors  $\neg C \Rightarrow \neg A$

$\neg C = \ll \exists n \in \mathbb{N}^* / \text{la suite de Collatz n'atterri pas de } n \text{ vers } 1 \gg$  qui se traduit par un Produit des termes de cette suite dont  $n$  atterrit vers un entier différent de 1.

$$\text{Soit } P = (3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1) \cdot (b_1)/2 \cdot (b_2)/2 \dots (b_h)/2 \neq 1$$

$$\Rightarrow \frac{3^m}{2^h} \left(a_1 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(a_2 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(a_m + \frac{1}{a_m}\right) \cdot (b_1) \cdot (b_2) \dots (b_h) \neq 1$$

Comme  $\neg C \Rightarrow \neg A$  c'est-à-dire  $\neg C \Rightarrow 2^h \leq 3^m$ , et comme le produit des tout les termes pairs & impairs est toujours  $> 1$  et que  $\left(\frac{3^m}{2^h}\right) \geq 1$ ,  $(2^h = 3^m \text{ si } \frac{m}{h} = \frac{\log 2}{\log 3})$

**ce qui donne, dans tous les cas, forcément  $P \neq 1$ .**

(exemple si  $m=1$  &  $h=1$ ,  $P$  avec 1 terme pair et 1 terme impair  $= \frac{3^1}{2^1} \left(1 + \frac{1}{1}\right) = 2 = 6 \neq 1$ )

Ce qui vérifie que  $\neg C \Rightarrow \neg A$  est toujours Vraie, donc  $(A \wedge B) \Rightarrow C$  est Vraie également. Sachant par la proposition III que l'implication  $C \Rightarrow (A \wedge B)$  est vrai aussi :

PROPOSITION IV :

$\forall n \in \mathbb{N}^*$  ; la suite de Collatz atterri de  $n$  vers **1**  $\Leftrightarrow (2^h > 3^m \text{ et } \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3})$  [8]

**Vérifiant maintenant qu'il n'existe aucun cycle de longueur  $k$ ,  $\forall k > 3 \in \mathbb{N}$  :**

$P$  étant le produit des termes de la suite de Collatz

$$\text{Soit } P = c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_k \quad [1]$$

$$P = a_1 \cdot a_2 \dots a_m \cdot b_1 \cdot b_2 \dots b_h \quad [2]$$

$$P = (3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1) \cdot (b_1)/2 \cdot (b_2)/2 \dots (b_h)/2 \quad [3]$$

$$\text{Et } 2^h = \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right) \quad [4]$$

Sachant par la PROPOSITION I, que le dernier terme  $C_k$  de la suite de Collatz est toujours impair soit  $k \in \mathbb{N}$  ( $k$  : longueur du cycle de la suite) :

. Supposons que  $C_k$  un nombre entier positif impair  $\leq (3a_m+1)$  qui définit un cycle de longueur  $k > 3$ .

Preuve :

le produit  $P$  final des termes de cette supposé suite soit  $= C_k$

et  $C_k$  se trouve dans le produit  $=$  à l'un des termes impairs de ce produit.

$$\Rightarrow (3a_1+1). (3a_2+1)...C_k... (3a_m+1). (b_1)/2. (b_2)/2... (b_h)/2. = C_k \quad [3] \quad 7/19$$

$$\Rightarrow (3a_1+1). (3a_2+1)...C_k... (3a_m+1). (b_1.b_2 \dots .b_h) / 2^h = C_k$$

$$\Rightarrow (3a_1+1). (3a_2+1)...C_k... (3a_m+1). (b_1.b_2 \dots .b_h) / C_k = 2^h \quad [9]$$

$$\text{D'après [4], } 2^h = \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right)$$

$$\Rightarrow 2^h = \left(\frac{3a_1+1}{a_1}\right) \cdot \left(\frac{3a_2+1}{a_2}\right) \dots \left(\frac{3a_m+1}{a_m}\right)$$

$$\Rightarrow 2^h = \left(\frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(\frac{1}{a_2}\right) \dots \left(\frac{1}{a_m}\right) \cdot (3a_1+1). (3a_2+1)... (3a_m+1).$$

$$\Rightarrow 2^h = \left(\frac{1}{a_1.a_2 \dots .a_m}\right) \cdot (3a_1+1). (3a_2+1)... (3a_m+1).$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a_1.a_2 \dots .a_m}\right) \cdot (3a_1+1). (3a_2+1)... (3a_m+1). = (3a_1+1). (3a_2+1)...C_k... (3a_m+1). (b_1.b_2 \dots .b_h) / C_k \quad [9]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a_1.a_2 \dots .a_m}\right) = \left(\frac{b_1. b_2 \dots .b_h}{C_k}\right)$$

$$\Rightarrow (a_1.a_2 \dots .a_m) \cdot (b_1. b_2 \dots .b_h) = C_k$$



D'où l'on tire que impair x paire = impair ?

⇒ **ABSURDE**

il n'existe aucun cycle de longueur  $k > 3$ , et selon PROPOSITION II, ∃! Cycle trivial, d'ou :

PROPOSITION V

$\forall n \in \mathbb{N}^* : \exists!$  Cycle dans la suite de Collatz, c'est le cycle trivial 4-2-1.

2)-  $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , la suite de collatz décroît vers un  $n' / n' < n$

De  $\mathbb{N}$ , l'ensemble des entiers naturels, considéré comme suite croissante, on peut extraire 4 sous-suites, étant donné leurs coefficients directeur positifs, donc également croissantes sous forme de  $4k+1$ ,  $4k+2$ ,  $4k+3$ , et  $4k+4$  avec  $k \in \mathbb{N}$ .

Si nous observons la transformation de Collatz sur ces 4 sous-suites nous constatons :

1° -  $4k+2$  et  $4k+4$  tous deux pairs, après 1 ou 2 suites de divisions successives par 2, finissent par décroître :  $4k+2$  pair  $\rightarrow 2k+1$  ( $2k+1$  impair,  $\forall k \in \mathbb{N}$ )  $\rightarrow 6k+4 \rightarrow 3k+2$ ; donc  $3k+2 < 4k+2$

$$4k+4 \text{ pair} \rightarrow 2k+2 \rightarrow k+1; \text{ donc } k+1 < 4k+4$$

8/19

(En Sachant que la parité de  $k+1$  ou  $3k+2$  dépend de la parité de  $k$ )

2° -  $4k+1$  est impair  $\Rightarrow$  1<sup>er</sup> étape :  $3(4k+1)+1 = 12k+4$  qui est pair

$\Rightarrow$  2<sup>er</sup> étape :  $(12k+4)/2 = 6k+2$  qui est pair

$\Rightarrow$  3<sup>er</sup> étape :  $(6k+2)/2 = 3k+1$  parité inconnue, mais nous constatons que  $4k+1$  décroisse puisque  $3k+1 < 4k+1$

3° -  $4k+3$  est impair  $\Rightarrow$  1<sup>er</sup> étape :  $3(4k+3)+1 = 12k+10$  qui est pair

$\Rightarrow$  2<sup>er</sup> étape :  $(12k+10)/2 = 6k+5$  qui est impair

$\Rightarrow$  3<sup>er</sup> étape :  $3(6k+5)+1 = 18k+16$  qui est pair

$\Rightarrow$  4<sup>er</sup> étape :  $(18k+16)/2 = 9k+8$  parité inconnue, mais nous constatons que  $4k+1$  croisse puisque  $9k+8 > 4k+1$

Démontrons dans un premier temps que tout nombre entier de la forme  $4k+3$  suivant la suite de Collatz pourrait se transformer en  $4k+1$  :

- **Tout nombre impair peut s'écrire sous forme  $2^p \cdot x - 1, \forall p \in \mathbb{N}^*$  :**

$\forall x \in \mathbb{N}$ , le produit =  $x \cdot$  une puissance de 2 est Pair, ôté de 1 est un nombre IMPAIR

- **Tout nombre impair de forme  $4k+1$  peut s'écrire sous forme  $2^p \cdot x - 1$  avec  $p=1$ ; (ou  $2x - 1$ ) :**

$\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $4k+1$  est impair,  $\forall x \in \mathbb{N} / 4k+1 = 2x - 1$

Preuve : soit  $4k+1 = I$  (impair)

$$I = 2x - 1 \Rightarrow x = \frac{I+1}{2}; \text{ comme } (I+1) \text{ est pair (somme de 2 impairs = pair)}$$

Donc  $(I+1) = 2 \cdot m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ )  $\Rightarrow x$  est également un entier  $\in \mathbb{N}^*$

- **Tout nombre impair de forme  $4k+3$  peut s'écrire sous forme  $2^p \cdot x - 1$  avec  $p > 1$ , leurs proportion tend vers zéro quand  $p$  tend vers  $\infty$ :**

$\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $4k+3$  est impair,  $\exists x \in \mathbb{N} / 4k+3 = 2^p \cdot x - 1$

Preuve :

$$4k+3 = 2^p \cdot x - 1 \Rightarrow x = \frac{4k+4}{2^p}$$

$$\Rightarrow x = \frac{k+1}{2^{p-2}} \quad (1)$$

Si dans (1) la proportion, selon étude de la récurrence, parmi les nombres de forme  $4k+3$  qui

croissent est  $P(4k+3) = \frac{1}{2^{p-2}} \Rightarrow$  la proportion des nombres de forme  $4k+3$  qui décroissent est égale

au complémentaire de  $P(4k+3)$ , soit  $(1 - \frac{1}{2^{p-2}})$  qui bien entendu si on considère cette fois-ci sur l'ensemble  $\mathbf{N}$ , des entiers naturels, représente la proportion  $P(4k+1)=1$  et  $P(4k+2)=1$  et  $P(4k+4)=1$  Et  $(1 - \frac{1}{2^{p-2}})$ ; c'est-à-dire  $Pr = (1 - \frac{1}{2^{p-2}}) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = (1 - \frac{1}{2^{p-2}})$  représentant la proportion de tout les entiers suivants la transformation de Collatz, décroissants durant les premières étapes .soit

$$Pr = (1 - \frac{1}{2^{p-2}})$$

$$Pr = \frac{2^{p-2} - 1}{2^{p-2}}$$

$$= \frac{4 \cdot 2^{p-2} - 4}{4 \cdot 2^{p-2}}$$

$$Pr = \frac{2^p - 4}{2^p}$$

nous constatons enfin que  $P(4k+3) = \frac{1}{2^{p-2}}$  proportion des nombres qui croissent dans  $\mathbf{N}$  suivant la suite de Collatz, le reste, c'est-à-dire  $Pr = \frac{2^p - 4}{2^p}$  décroissant en suivant la transformation de Collatz dans  $\mathbf{N}$ ,

nous vérifions que leurs somme est égale à l'unité :

$$\frac{2^p - 4}{2^p} + \frac{1}{2^{p-2}} = \frac{2^p - 4}{2^p} + \frac{4}{2^p} = \frac{2^p}{2^p} = 1$$

nous vérifions aussi que :

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{p-2}} \text{ quand } p \rightarrow \infty \text{ est } 0 \text{ (comme nous avons annoncé ci-dessus)}$$

$$= \Rightarrow \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{2^p - 4}{2^p} \text{ quand } p \rightarrow \infty \text{ est } 1; \text{ qui va dans le sens de } \underline{\forall x \in \mathbf{N}^* \setminus \{1\}}, \text{ la suite de collatz}$$

décroit vers un  $x' / x' < x$

(ex : pour  $p=10$ , en appliquant les 2 formules,  $Pr = 99.60\%$  des nombres décroissent suivant la transformation de Collatz, alors que  $0.40\%$  croissent,)

l'argument de la probabilité n'est point suffisant, il faudra alors que nous démontrons qu'un nombre impair de la forme  $4k+3$  peut par la suite de Collatz passer à la forme  $4k+1$  :

Appliquons la transformation de Collatz sur le nombre impair  $4k+3$  :

$$\text{Soit le nombre } N_1 = 4k+3 = 2^p \cdot x - 1$$

$$\text{Calculons } N_2 = (3N_1 + 1)/2 = (3(2^p \cdot x - 1) + 1)/2 = (3 \cdot 2^p \cdot x - 2)/2 = 3 \cdot 2^{p-1} \cdot x - 1 \quad : 1^\circ \text{étape}$$

$$N_3 = (3N_2 + 1)/2 = (3(3 \cdot 2^{p-1} \cdot x - 1) + 1)/2 = (3^2 \cdot 2^{p-1} \cdot x - 2)/2 = 3^2 \cdot 2^{p-2} \cdot x - 1 \quad : 2^\circ \text{étape}$$

$$\dots\dots \text{Déduisons par récurrence le terme général de la suite ; } N_p = 3^{p-1} \cdot 2 \cdot x - 1 \quad : (p-1)^\circ \text{étape}$$

Finalement la puissance  $p$ , de 2 descend à 1, le nombre prend donc la forme  $2x'-1$  ( $x' = 3^{p-1} \cdot x$ ),

### Récapitulation :

- le nombre  $4k+4$  décroît à  $k+1$  au bout de 1 étape, la suite dépend de la parité de  $k$
- le nombre  $4k+2$  décroît à  $3k+2$  au bout de 2 étapes, la suite dépend de la parité de  $k$
- le nombre  $4k+1$  décroît à  $3k+1$  au bout de 3 étapes, la suite dépend de la parité de  $k$
- le nombre  $4k+3$  croît à  $9k+8$  au bout de 4 étapes, la suite dépend de la parité de  $k$

**Démontrons respectivement que pour tout nombre de forme  $k+1$ ,  $3k+2$ ,  $3k+1$ ,  $9k+8$  ; il finit par décroître  $\forall$  la parité de  $k$  :**

*Les nombres  $(k+1)$ ,  $(3k+2)$ ,  $(3k+1)$  et  $(9k+8)$  seront impairs si respectivement  $k$  est pair pour  $(k+1)$  et  $(3k+1)$ , ou  $k$  est impair pour les nombres  $(3k+2)$  et  $(9k+8)$  et inversement, ils seront pairs si  $k$  est impair pour  $(k+1)$  et  $(3k+1)$ , ou  $k$  est pair pour les nombres  $(3k+2)$  et  $(9k+8)$ .*

### A) - soit $P_1$ , le produit de ces termes impairs

*Optant pour un choix de parité de  $k$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ , de façon à ce que tout les termes obtenus de la suite de Collatz à partir de  $(A_{1,k} + B_1)$  soient impairs et ne nécessitent que la multiplication par 3 ajouté à 1 avant de passer à la division par 2.*

$$P_1 = (A_{1,k} + B_1) \cdot \left(3 \left(\frac{A_{1,k} + B_1}{2}\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(\frac{A_{1,k} + B_1}{2}\right) + 1\right) + 1 \dots (A_{m,k} + B_m)$$

Pour  $3k+1$  impair,  $k$  est pair :

$$\begin{aligned} P_1 &= (3k+1) \cdot \left(3 \left(\frac{3k+1}{2}\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(\frac{3k+1}{2}\right) + 1\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(3 \left(\frac{3k+1}{2}\right) + 1\right) + 1\right) + 1\right) \dots (A_{m,k} + B_m) \\ &= (3k+1) \cdot \left(\frac{9k+5}{2}\right) \cdot \left(\frac{27k+17}{2}\right) \cdot \left(\frac{81k+53}{2}\right) \dots (A_{m,k} + B_m) \end{aligned}$$

Nous remarquons que les  $(A_{m,k})$  progressent par rapport à  $m$  de  $\frac{1}{2} \cdot 3^{m+1}$

tandis que les  $(B_m)$  s'expriment selon la somme  $S$ , d'une suite géométrique  $\frac{1}{2} \cdot 3^{m+1}$

$$\begin{aligned} U_{0=1}, \quad (B_m) &: \frac{1}{2} (1, 5, 17, 53, 161 \dots) \\ &: \frac{1}{2} (4 \cdot 3^0, 4 \cdot 3^1, 4 \cdot 3^2, 4 \cdot 3^3, \dots, 4 \cdot 3^m) \\ &: 2 \cdot (3^0, 3^1, 3^2, 3^3, \dots, 3^m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Posons} \quad S &= 3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^m \\ 3S &= 3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{m+1} \end{aligned}$$

$$3S - S = 3^{m+1} + (3^m - 3^m) + \dots + (3 - 3) - 1 = 3^{m+1} - 1$$

$$S = \frac{3^{m+1} - 1}{3 - 1} \quad \Rightarrow \quad (B_m) = \frac{1}{2} (U_0 + 2 \cdot (3^m - 1)) = \frac{1}{2} (2 \cdot 3^m - 1)$$

D'où l'on tire la formule explicite du produit des termes impairs de la transformation du Collatz  $P_1 = 3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)$  étant le dernier terme avant de passer à la division par 2

pour  $3k+2$  impair,  $k$  impair:

$$P_1 = (3 \cdot k + 2) \cdot \left(3 \left(\frac{3k+2}{2}\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(\frac{3k+2}{2}\right) + 1\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(3 \left(\frac{3k+2}{2}\right) + 1\right) + 1\right) + 1\right) \dots \cdot (A_{m,k} + B_m)$$

$$= (3 \cdot k + 2) \cdot \left(\frac{9k+8}{2}\right) \cdot \left(\frac{27k+26}{2}\right) \cdot \left(\frac{81k+80}{2}\right) \dots \cdot (A_{m,k} + B_m)$$

Nous remarquons que les  $(A_{m,k})$  progressent par rapport à  $m$  de  $\frac{1}{2} \cdot 3^{m+1}$

tandis que les  $(B_m)$  s'expriment aussi par rapport à  $\frac{1}{2} \cdot 3^{m+1}$  ôté de 1 :

avec  $(A_{m,k}) = \frac{1}{2} \cdot 3^{m+1}$ , nous remarquons que les  $(B_m)$  progressent de  $\frac{1}{2} \cdot (3^{m+1} - 1)$  :

$$(B_m) = \frac{1}{2} \cdot ((3-1), (9-1), (27-1), \dots, (3^m-1)) = \frac{1}{2} \cdot (2, 8, 26, 80, \dots, (3^m-1))$$

D'où l'on tire la formule explicite du produit des termes impairs de la transformation du Collatz  $P_1 = 3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)$  étant le dernier terme avant de passer à la division par 2

Pour  $k+1$  impair,  $k$  pair :

$$P_1 = (k+1) \cdot \left(3 \left(\frac{k+1}{2}\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(\frac{k+1}{2}\right) + 1\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(3 \left(\frac{k+1}{2}\right) + 1\right) + 1\right) + 1\right) \dots \cdot (A_{m,k} + B_m)$$

$$= (k+1) \cdot \left(\frac{3k+4}{2}\right) \cdot \left(\frac{9k+14}{2}\right) \cdot \left(\frac{27k+44}{2}\right) \cdot \left(\frac{81k+134}{2}\right) \cdot \dots \cdot (A_{m,k} + B_m)$$

Nous remarquons que les  $(A_{m,k})$  progressent par rapport à  $m$  de  $\frac{1}{2} \cdot 3^m$

tandis que les  $(B_m)$  s'expriment selon la progression suivante :

$$(B_m) = \frac{1}{2} \cdot (1, 4, 14, 44, 134, \dots, B_m)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot ((4-1)=3, (14-4)=10, (44-14)=30, (134-44)=90, \dots)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (1 + 3 + 10(3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots))$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 10 \left(\frac{3^m-1}{2}\right) \text{ avec } (U_0 = 1, m = 1 \Rightarrow U_1 = 4, m = 2 \Rightarrow U_2 = 14, m = 3 \Rightarrow U_3 = 44 \dots)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (5 \cdot 3^{m-1} - 1)$$

D'où l'on tire la formule explicite du produit des termes impairs de la transformation du Collatz  $P_1 = 3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1$ , étant le dernier terme impair, avant de passer à la division par 2).

Pour  $9k+8$  impair,  $k$  impair:

$$P_1 = (9k+8) \cdot \left(3 \left(\frac{9k+8}{2}\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(\frac{9k+8}{2}\right) + 1\right) + 1\right) \cdot \left(3 \left(3 \left(3 \left(\frac{9k+8}{2}\right) + 1\right) + 1\right) + 1\right) \dots \cdot (A_{m,k} + B_m)$$

$$= (9k+8) \cdot \frac{(27k+26)}{2} \cdot \frac{(81k+80)}{2} \cdot \frac{(243k+242)}{2} \dots (A_{m,k} + B_m) \quad (1) \quad 12/19$$

Nous remarquons que les  $(A_{m,k})$  progressent par rapport à  $m$  de  $\frac{1}{2} \cdot 3^{m+2}$

tandis que les  $(B_m)$  s'expriment selon les  $(A_{m,k})$  ôté de 1 :

$$(B_m) = \frac{1}{2} \left( (9-1), (27-1), (81-1), (243-1) \dots, (3^{m+2}-1) \right) = \frac{1}{2} \left( 8, 27, 80, 242, \dots, (3^m-1) \right)$$

D'où l'on tire la formule explicite du produit des termes impairs de la transformation du Collatz  $P_1 = 3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1$  étant le dernier terme avant de passer à la division par 2.

$(A_{i,k} + B_i)$	$3k+1$	$3k+2$	$k+1$	$9k+8$
$i=1$	$9k+5$	$9k+8$	$3k+4$	$27k+26$
$i=2$	$27k+17$	$27k+26$	$9k+14$	$81k+80$
$i=3$	$81k+53$	$81k+80$	$27k+44$	$243k+242$
$i=4$	$243k+161$	$243k+242$	$81k+134$	$729k+728$
""	""	""	""	""
""	""	""	""	""
""	""	""	""	""
$i=m$	$3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)$	$3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)$	$3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1$	$3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1$

**B) - soit  $P_2$ , le produit de ces termes pairs**

Optant pour un choix de parité de  $k$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ , de façon à ce que tout les termes obtenus de la suite de Collatz à partir de  $(A_{m,k} + B_m)$  qui est le dernier terme impair vu en **A)**

Dont nous remarquons que selon l'ordre de parité de  $k$ ,  $(A_{m,k} + B_m)$  marque une altitude maximale quand il devient une puissance de 2 garantissant un atterrissage vers 1.

$$P_2 = (A_{m,k} + B_m) / 2 \cdot (A_{m,k} + B_m) / 2^2 \dots (A_{m,k} + B_m) / 2^h$$

$$P_2 = \frac{(A_{m,k} + B_m)}{2^h}$$

Qui pour  $3k+1$  pair et  $k$  impair,  $P_2 = \frac{3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)}{2^h}$

pour  $3k+2$  pair et  $k$  pair,  $P_2 = \frac{3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)}{2^h}$

pour  $k+1$  pair et  $k$  impair  $P_2 = \frac{3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1}{2^h}$

Qui pour  $9k+8$  pair et  $k$  pair,  $P_2 = \frac{3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1}{2^h}$

**C) - soit P, le produit de tous les termes de notre suite**

13/19

Notre choix se limite au premier terme impair dont le produit  $P=P_1 \cdot P_2$  qui nécessite  $P_1$  et  $P_2$ , d'abord  $P_1$  des termes impairs, ensuite  $P_2$  selon l'ordre  $i, p, i, p, i, p$

$$P = (A_{1,k} + B_1) \cdot (3(A_{1,k} + B_1) + 1) \cdot (3(A_{1,k} + B_1) + 1) \dots (A_{m,k} + B_m) / 2 \dots (A_{m,k} + B_m) / 4 \dots (A_{1,k} + B_1) / 2^h$$

- pour  $3k+1$  :

$$P = 3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1) \cdot \left( \frac{3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)}{2^h} \right)$$

$$= \left( 3^m \cdot 3 \cdot k + 3^m \cdot 2 - 3^m \cdot \frac{1}{3^m} \right) \cdot \left( \frac{3^{m+1} \cdot k + \frac{3^{m+1} - 1}{2}}{2^h} \right)$$

$$P = \frac{3^m}{2^h} \left( 3 \cdot k + 2 - \frac{1}{3^m} \right) \cdot (3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1))$$

La suite de Collatz atterrit de  $n$  vers 1, veut dire aussi que  $P$ , compte tenu cette fois-ci de la parité de  $k$ ,  $P=1$  :

$$\frac{3^m}{2^h} \left( 3 \cdot k + 2 - \frac{1}{3^m} \right) \cdot (3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)) = 1$$

$$\frac{3^m}{2^h} \quad \times \quad Q1 \quad \times \quad Q2 \quad = \quad 1$$

$Q1 = \left( 3 \cdot k + 2 - \frac{1}{3^m} \right)$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q1=5/3$  minimum )

$Q2 = 3^{m+1} \cdot k + (2 \cdot 3^m - 1)$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q2=5$  minimum )

Pour que l'équation  $\left( \frac{3^m}{2^h} \times Q1 \times Q2 \right) = 1$ ; forcément  $\frac{3^m}{2^h} < 1$

$$\Rightarrow \frac{3^m}{2^h} < 1 \Rightarrow 3^m < 2^h \Rightarrow 2^h > 3^m$$

$$2^h > 3^m \Rightarrow h \log 2 > m \log 3 \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \quad ( m \& h \in \mathbb{N}^* )$$

$(2^h > 3^m)$  et  $\left( \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \right) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$ ; la suite de Collatz atterrit de  $n$  vers 1; d'après la PROPOSITION IV.

- pour  $3k+2$

$$P = 3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1) \cdot \left( \frac{3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)}{2^h} \right)$$

$$= \left( 3^m \cdot 3 \cdot k + 3^m \cdot 3 - 3^m \cdot \frac{1}{3^m} \right) \cdot \left( \frac{3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)}{2^h} \right)$$

$$P = \frac{3^m}{2^h} \left( 3 \cdot k + 3 - \frac{1}{3^m} \right) \cdot (3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1))$$

La suite de Collatz atterrit de  $n$  vers 1, veut dire aussi que  $P$ , compte tenu cette fois-ci de la parité de  $k$ ,  $P=1$  :

$$\frac{3^m}{2^h} \left( 3 \cdot k + 3 - \frac{1}{3^m} \right) \cdot (3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1)) = 1$$

$$\frac{3^m}{2^h} \quad \times \quad Q1 \quad \times \quad Q2 \quad = \quad 1$$

$Q1 = \left( 3 \cdot k + 3 - \frac{1}{3^m} \right)$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q1=8/3$  minimum )

$Q2 = (3^{m+1} \cdot k + (3^{m+1} - 1))$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q2=17$  minimum )

Pour que l'équation  $\left( \frac{3^m}{2^h} \times Q1 \times Q2 \right) = 1$ ; forcément  $\frac{3^m}{2^h} < 1$

$$\Rightarrow \frac{3^m}{2^h} < 1 \Rightarrow 3^m < 2^h \Rightarrow 2^h > 3^m$$

$$2^h > 3^m \Rightarrow h \log 2 > m \log 3 \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \quad (m \& h \in \mathbb{N}^*)$$

$(2^h > 3^m)$  et  $(\frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$  ; la suite de Collatz atterri de n vers 1 ; d'après la PROPOSITION IV .

$$\begin{aligned} \text{- pour } \underline{k+1} : P &= (3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1) \cdot \left( \frac{3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1}{2^h} \right) \\ &= (3^m \cdot k + 15 \cdot 3^m - 3^m \cdot \frac{1}{3^m}) \cdot (3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1) \\ P &= \frac{3^m}{2^h} (k + 15 - \frac{1}{3^m}) \cdot (3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1) \end{aligned}$$

La suite de Collatz atterri de n vers 1 , veut dire aussi que P ,compte tenu cette fois-ci de la parité de k , P=1 :

$$\begin{aligned} \frac{3^m}{2^h} (k + 15 - \frac{1}{3^m}) \cdot (3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1) &= 1 \\ \frac{3^m}{2^h} \quad \times Q1 \quad \times Q2 &= 1 \end{aligned}$$

$Q1 = (k + 15 - \frac{1}{3^m})$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q1=14$  minimum )

$Q2 = (3^m \cdot k + 5 \cdot 3^{m-1} - 1)$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q2=4$  minimum )

Pour que l'équation  $(\frac{3^m}{2^h} \times Q1 \times Q2 = 1)$  forcément  $\frac{3^m}{2^h} < 1$

$$\Rightarrow \frac{3^m}{2^h} < 1 \Rightarrow 3^m < 2^h \Rightarrow 2^h > 3^m$$

$$2^h > 3^m \Rightarrow h \log 2 > m \log 3 \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \quad (m \& h \in \mathbb{N}^*)$$

$(2^h > 3^m)$  et  $(\frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$  ; la suite de Collatz atterri de n vers 1 ; d'après la PROPOSITION IV .

\*\*\*\*

$$\begin{aligned} \text{- pour } \underline{9k+8} : P &= 3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1 \cdot \left( \frac{3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1}{2^h} \right) \\ &= 3^m \cdot 9 \cdot k + 3^m \cdot 9 - 3^m \cdot \frac{1}{3^m} \cdot \left( \frac{3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1}{2^h} \right) \\ P &= \frac{3^m}{2^h} (9 \cdot k + 9 - \frac{1}{3^m}) \cdot (3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1) \\ P &= \frac{3^m}{2^h} (9 \cdot k + 9 - \frac{1}{3^m}) \cdot (3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1) \end{aligned}$$

La suite de Collatz atterri de n vers 1 , veut dire aussi que P ,compte tenu cette fois-ci de la parité de k , P=1 :

$$\begin{aligned} P &= \frac{3^m}{2^h} (9 \cdot k + 9 - \frac{1}{3^m}) \cdot (3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1) = 1 \\ &= \frac{3^m}{2^h} \quad \times Q1 \quad \times Q2 = 1 \end{aligned}$$

$Q1 = (9 \cdot k + 9 - \frac{1}{3^m})$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q1=8$  minimum )

$Q2 = (3^{m+2} \cdot k + 3^{m+2} - 1)$  est toujours  $> 1$  ( pour  $m=1$  &  $k=0 \Rightarrow Q2=26$  minimum )

Pour que l'équation  $(\frac{3^m}{2^h} \times Q1 \times Q2 = 1)$  forcément  $\frac{3^m}{2^h} < 1$

$$\Rightarrow \frac{3^m}{2^h} < 1 \Rightarrow 3^m < 2^h \Rightarrow 2^h > 3^m$$

14/19

$$2^h > 3^m \Rightarrow h \log 2 > m \log 3 \Rightarrow \frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3} \quad (m \& h \in \mathbb{N}^*)$$

$(2^h > 3^m)$  et  $(\frac{m}{h} < \frac{\log 2}{\log 3}) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$  ; la suite de Collatz atterri de  $n$  vers 1 ; d'après la PROPOSITION IV .

*Conclusion :  $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , la suite de collatz décroît vers un  $n' / n' < n$*

Nous remarquons que  $4k+3$  en passant à  $4k+1$ , ce dernier reste supérieur à  $4k+3$ , comme nous le montrons :

$$2^p \cdot x - 1 < 3^{p-1} \cdot 2 \cdot x - 1 \Rightarrow 2^p < 3^{p-1} \cdot 2 \Rightarrow 2^{p-1} < 3^{p-1} \text{ Ce qui est évident}$$

Nous avons vu en 1° que les formes  $4k+2$  et  $4k+4$  finissent par décroître mais nous remarquons que le processus est plus évident dans la forme  $4k+4$  que dans la forme  $4k+2$

Parce que seuls les  $4k+4$  contiennent les puissance de 2 (P2) qui garantissent un trajectoire sûr vers 1 suite à des divisions successives par 2, mais il ya aussi des non-P2 dans  $4k+4$  et seulement des non P2 dans la forme  $4k+2$ . (selon études des 2 suites.)

En ce qui concerne les  $4k+1$  et les  $4k+3$ , si  $4k+1$  décroît au bout de trois étapes et durant la transformation de Collatz, les  $4k+3$  finissent par se transformer en  $4k+1$  et décroître rien nous garantit que ce dernier  $4k+1$ , reste dans cette forme et décroît vers 1, car le processus de la transformation est en réalité « réciproque » comme le montre cette exemple du nombre 19 de forme  $4k+3$  ( $4 \cdot 4 + 3$ ) génère dans la trajectoire 29 de forme  $4k+1$  ( $4 \cdot 7 + 1$ ) qui donne 11 de forme  $4k+3$  ( $4 \cdot 2 + 3$ ), qui donne à son tour un  $4k+1$  : 17 (puis 13, puis 5 qui reste le dernier  $4k+1$  de la suite de Collatz si bien sur 32 ne prend pas sa place dans un autre  $x \in \mathbb{N}^*$ ).

19 58 29 88 44 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Nous constatons que la décroissance de  $4k+2$  et  $4k+4$  est acquise, et si du fait de la réciprocity du passage de la forme  $4k+3$  à  $4k+1$ , nous considérons qu'ils se transforment entre eux équitablement ;

Nous concluons que dans plus des  $\frac{3}{4}$  des cas, la tendance est à la décroissance, il nous reste que de trouver le moyen de suivre le vol et de démontrer effectivement qu'ils terminent dans le cycle trivial c'est que nous essayons de faire dans la 3° partie qui suit.

3)-  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ , la suite de collatz, atterrit dans le cycle trivial dont 1, est le plus petit élément.

PROPOSITION –VI

$$\forall x \text{ impair} \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}^*; \exists ! x / \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = x ; \text{ soit } x_i = 1$$

preuve :

Soit  $U_n$  ; la suite des nombres impairs ;  $\forall n \in \mathbb{N}$  ,  $U_n = 2n + 1$  ( $x_1=U_1=1$  ;  $x_2=U_2=3$  ;  $x_3=U_3=5$  ;  $x_4=U_4=7$  ...).

$$\text{Soit } V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i ; V_1 = \frac{U(1)}{1} = 1 ; V_2 = \frac{(U_1+U_2)}{2} = 2 ; V_3 = \frac{(U_1+U_2+U_3)}{3} = 3 ;$$

$$V_4 = \frac{(U_1+U_2+U_3+U_4)}{4} = 4 \Rightarrow \dots \text{ Par récurrence, déduisons sa formule explicite } V_n = n$$

$n < 2n+1 \Leftrightarrow V_n < U_n$  et  $V_n = U_n$  ssi  $n=1$  c à d  $x_i \text{ impair} = 1$  ; d'où la proposition II.

PROPOSITION –VII

**Dans  $\mathbb{N}$ , l'ensemble des entiers naturels ; il ya autant de nombre pairs que d'impairs**

Preuve :

$$\text{Soit la formule du binome de Newton } (x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

$$\text{Avec } a = 1 \text{ \& } b = 1 ; \exists M \text{ parties de l'ensemble } E / M = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Rightarrow M = (1 + 1)^n = 2^n$$

$$\text{Soit } M_p \text{ le nombre de parties de cardinal pair : } M_p = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \binom{n}{6} \dots = \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p}$$

Soit  $M_i$  le nombre de parties de cardinal impair dont la somme est comptée jusqu'au dernier impair

$$\text{inferieur à } n : M_i = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = \sum_{p=0}^{(n-1)/2} \binom{n}{2p+1} ;$$

$$\text{Avec } a = 1 \text{ \& } b = -1 \Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \binom{n}{6} \dots - \binom{n}{1} - \binom{n}{3} - \binom{n}{5} - \dots$$

parce que  $(-1)^k = 1$  si  $k$  est pair et  $(-1)^k = -1$  signe négative qui affecte  $M_i$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p} - \sum_{p=0}^{(n-1)/2} \binom{n}{2p+1}$$

Comme  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0$

$$\Rightarrow \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p} - \sum_{p=0}^{(n-1)/2} \binom{n}{2p+1} = 0 ; \text{ on déduit que } \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p} = \sum_{p=0}^{(n-1)/2} \binom{n}{2p+1}$$

$\Rightarrow$  **Le nombre de sous-parties de cardinal pair = nombre de sous-parties de cardinal impair**

La suite de Collatz peut être présentée sous un produit en spécifiant les nombres impairs ( $a_1, a_2, \dots, a_m$ ) et les nombres pairs ( $b_1, b_2, \dots, b_h$ ); encore une fois, selon deux formes de produits P1, puis P2 exprimé suivant la transformation de Collatz.  $m$  et  $h$  étant respectivement le cardinal des nombres impairs et pairs. ( $m \& h \in \mathbb{N}^*$ )

$$P2 = a_1 \cdot a_2 \dots a_m \cdot b_1 \cdot b_2 \dots b_h$$

$$P1 = (3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1) \cdot (b_1)/2 \cdot (b_2)/2 \dots (b_h)/2$$

Utilisant encore une fois l'équation associée à ce produit sous sa forme brute

$$(a_1 \cdot a_2 \dots a_m) \cdot b_1 \cdot b_2 \dots b_h = (3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1) \cdot (b_1)/2 \cdot (b_2)/2 \dots (b_h)/2$$

$$(a_1 \cdot a_2 \dots a_m) \cdot b_1 \cdot b_2 \dots b_h = \frac{(3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1) \cdot (b_1) \cdot (b_2) \dots (b_h)}{2^h}$$

$$2^h = \frac{(3a_1+1) \cdot (3a_2+1) \dots (3a_m+1)}{(a_1 \cdot a_2 \dots a_m)}$$

$$2^h = \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right)$$

Or  $2^h < 3^m < \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right)$

$$\Rightarrow 2^h < \left(3 + \frac{1}{a_1}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{a_m}\right)$$

Remplaçons les  $a_i$  par  $M$  « moyenne arithmétique » défini sur  $m \Rightarrow M = \sum_{i=1}^m \frac{a_i}{m}$

$$M > 0 \Rightarrow 2^h < \left(3 + \frac{1}{M}\right) \cdot \left(3 + \frac{1}{M}\right) \dots \left(3 + \frac{1}{M}\right) m \text{ fois}$$

$$\Rightarrow 2^h < \left(\frac{3M+1}{M}\right)^m$$

- Supposons un nombre  $x \in \mathbb{N}^*$  infiniment grand dont la trajectoire par la transformation de Collatz, passe dans tous les nombres pairs et impairs, comme selon la proposition VII, il y aura autant de pair que d'impair, on pose donc  $m=h$

$$2^h < \left(\frac{3M+1}{M}\right)^h \text{ ou } 2^m < \left(\frac{3M+1}{M}\right)^m$$

Appliquons le théorème des fonctions réciproques, c'est-à-dire :

18/19

•

$\forall x \in \mathbb{N}^*$ , si x est positif et  $x=y^n \Leftrightarrow y=\sqrt[n]{y^n}$  est unique.

Utilisant la racine nième jusqu'à m ou h, pour arriver au supposé dernier terme de la trajectoire parti d'un grand nombre infini :

$$\sqrt[m]{2^m} < \sqrt[m]{\left(\frac{3M+1}{M}\right)^m} \text{ Ou } \sqrt[h]{2^h} < \sqrt[h]{\left(\frac{3M+1}{M}\right)^h}$$

$$2 < \left(\frac{3M+1}{M}\right)$$

- soit un entier quelconque K qui puisse égaliser notre inéquation de manière à chercher un autre entier, si il existe, commun à la fin du parcours de la transformation de Collatz des termes pairs d'un coté ( puissance de 2 ), d'un autre coté, les termes impairs :

$$2 + k = \frac{3M+1}{M}$$

$$2M + kM = 3M + 1$$

$$kM - M = 1$$

$$M(k-1) = 1 \Rightarrow \text{admet comme solutions : } \underline{M=1} \text{ \& } \underline{k=2} (\in \mathbb{N}^*)$$

Comme, **suyant proposition II** :  $\exists! M \in \mathbb{N}^* / M = \sum_{i=1}^m \frac{a_i}{m} = a_i$  soit  $a_i = 1$ , et comme  $M=1$  donc  $a_i$ , le dernier terme impair est connu soit  $a_i = 1$ . ( c'est comme nous avons vu dans la suite  $V_n$  et  $U_n$ , en sens inverse, dans la **proposition II** ).

Notre équation épurée et simplifiée devient :  $4 = \frac{3a_i+1}{a_i}$ , observons des 2 cotés :

Du coté droit, l'équation garde les nombres  $a_i$  impairs, avec  $a_i$  dernier terme =1

Démonstration :

Si  $a_i = 1$  est seulement premier terme de la suite de Collatz, sa transformation est celle qui concerne le cycle trivial :  $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ , nous constatons aussi que c'est aussi le dernier terme  $a_i=1$ , qui est en même temps le plus petit élément impair, du cycle trivial. (Suyant proposition I).

Si  $a_i$  est dernier terme impair  $> 1 \Rightarrow$  l'équation  $4 = \frac{3a_i+1}{a_i}$ , devient impossible puisque :

$$4 > \frac{3a_i+1}{a_i} \Rightarrow 4 > 3 + \frac{1}{a_i} \text{ si } a_i > 1$$

Donc  $a_i$  est forcément le dernier terme impair de la suite =1 **CQFD**

Du coté gauche : partant d'une puissance de 2 très grande et arrivant au dernier terme La racine nième qui colle à la trajectoire de la suite, s'arrête dans notre équation à 4 Le reste est pris en charge finalement par le cycle trivial, par 4 ou par 1,  **$\forall x$  pair ou impair  $\in \mathbb{N}^*$**  du départ.

Nous avons  $4 = 2^2 = 2^h$ ,  $h = 2$  étant le cardinal des nombres pairs dans ce dernier terme pair de la suite, nous connaissons déjà un : c'est 4 nous déduisons forcément le deuxième élément pair du cycle trivial : 2, solution aussi de l'équation avec 1 et passage obligé de 4 à 1 par la transformation de Collatz.

Conclusion finale :

Comme  $\exists!$  Cycle trivial dans la suite de COLLATZ (1)  $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ ,  $n$  décroisse suivant la transformation de COLLATZ (2), atterri forcément dans le cycle trivial dont 1 son plus petit élément. (3)

**CQFD**

CASABLANCA LE 01.12.2015

BERKOUK MOHAMED, email : [bellevue-2011@hotmail.com](mailto:bellevue-2011@hotmail.com)

[Mohamed.berkouk@aei-maroc.ma](mailto:Mohamed.berkouk@aei-maroc.ma)

Référence :

*J.P- Delahaye - Christian Lasou- UST- Licence S.T -2007.*

*- Shalom Eliahou, problème  $3n+1$  : y a-t-il des cycles non triviaux ? -I.des math-2011.*

*-Luc-Olivier Pochon & Alain Favre ; version du 13 juillet 2017*