

# Простая теория относительности в модели 4D материки

Валерий П. Скоробогатов

<http://aperonics.ucoz.ru> mailto://vps137@yandex.ru

Теория относительности, несомненно, является самой популярной теорией в настоящее время, и ей посвящено огромное количество публикаций. Отметим лишь одну, в которой приведены различные виды преобразований пространства и времени [1]. Казалось бы, за более чем столетний период её существования, наполненный неустанной борьбой её противников и её сторонников, не осталось ничего нового сказать об этой теории. Однако мы приведём здесь простейший вывод одного из главных результатов специальной теории относительности (СТО) – уравнений преобразований Лоренца (ПЛ). Он основан на нашей предыдущей публикации [2], в которой ПЛ сведены к обычному ортогональному преобразованию. Естественный вопрос, возникший после этого, – а нельзя ли, наоборот, каким-то образом из ортогонального преобразования получить ПЛ?


Оказалось, это можно сделать очень просто. Для этого вначале переформулируем постулат СТО о скорости света следующим образом:

- Скорость света – это максимальная скорость для тел

Это значит, что не может быть материальных тел, скорость которых превысит скорость света  $c$ . Пока ничего не говорим о значениях скорости света в различных инерционных системах отсчёта (ИСО). В математической форме это условие можно представить так:

$$V = c \sin \alpha \quad (1)$$


Смысл угла  $\alpha$  легко уяснить, если нарисовать рисунок, поясняющий это условие. Предполагается, что некое тело движется с постоянной скоростью  $V$  в направлении оси  $x$  и что свет, испущенный из положения, когда расстояние от источника света до тела было минимальным, достигает тела. К этому времени тело преодолеет расстояние  $Vt$ . Конечно, при этом получается, что вектор  $ct$  направлен относительно оси  $x$  не перпендикулярно. Иначе, надо было бы использовать вместо синуса тангенс, что противоречило бы нашему условию, поскольку скорость тела могла бы быть больше скорости света при углах  $\alpha$  больших, чем  $\pi/2$ .




Из этого рисунка можно заключить, что пространство и время, если их, следя СТО, попытаться объединить в одну конструкцию, не могут образовать декартову систему координат, как по умолчанию это предполагается в СТО. Получается косоугольная система.

Без ущерба для дальнейшего рассмотрения мы можем перенести начало системы координат в то место, откуда, предполагается, исходит свет. Примем такую систему координат за неподвижную систему отсчёта. В её начало, можно считать, помещен наблюдатель, который следит за движущимся телом. В той простой ситуации, которая описывается, он видит, что за время наблюдения  $t$  тело, находившееся в первый момент наблюдения в ближайшем положении, переместилось на расстояние  $Vt$ .

С движущимся телом мы можем связать движущуюся с ним систему отсчёта. Поскольку скорость тела в этой системе координат отсутствует, угол  $\alpha$  для этого тела равен нулю. Это значит, что ось  $x'$  движущейся системы отсчёта в момент времени  $t$  должна быть перпендикулярной вектору  $ct$ . Поэтому у нас должен получиться рисунок, подобный тому, что изображен. Там также отмечено положение произвольно взятой точки на оси  $x$ .



Из этого рисунка становится очевидным, что мы имеем дело с обычным ортогональным преобразованием, изменяющим координаты некоего вектора  $H$ . Остается сделать некоторые дополнительные построения, как это сделано на рисунке ниже, чтобы убедиться, что координаты  $(x, ct')$  этого вектора одной декартовой системы координат, изображенного на рисунке, преобразуются в координаты  $(x', ct)$  другой декартовой системы.



Из ортогональности такого преобразования следует, что длина этого вектора в одной системе координат равна длине в другой системе

$$H = \sqrt{x^2 + (ct')^2} = \sqrt{x'^2 + (ct)^2} = H' \quad (2)$$

Отсюда перестановкой слагаемых следует равенство т.н. интервалов СТО:

$$s = \sqrt{(ct)^2 - x^2} = \sqrt{(ct')^2 - x'^2} = s' \quad (3)$$

Конечно, также можно данную картину рассматривать так, как будто вектор  $(x, ct)$  одной косоугольной системы координат преобразовал свои координаты в значения  $(x', ct')$  другой косоугольной системы. Однако значения координат в этом случае станут другими и, очевидно, что такое преобразование не будет являться ортогональным поворотом системы координат. Такое представление не даст выше приведённых равенств.

В матричной форме ортогональное преобразование выразится в таком виде:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y \\ z \\ ct \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ct' \end{pmatrix} \quad (4)$$

Отсюда с помощью (1) мы имеем следующую систему уравнений, исключая тривиальные:

$$\begin{aligned} x' &= x \sqrt{1 - V^2/c^2} - Vt' \\ ct &= xV/c + ct' \sqrt{1 - V^2/c^2} \end{aligned}$$

Первое уравнение разрешим относительно  $x$

$$x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (5)$$

Затем подставляем это значение во второе уравнение

$$ct = \frac{(x' + Vt')V/c}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} + ct' \sqrt{1 - V^2/c^2}$$


После приведения к общему знаменателю мы получим

$$ct = \frac{ct' + x'V/c}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (6)$$

Вместе уравнения (5) и (6) составляют ПЛ. Таким образом, начав с требования о предельной скорости, простыми и очевидными операциями, мы получили главный результат СТО. Осталось понять, почему это произошло и имеет ли это какое-то отношение к реальным явлениям в природе.

### Случай общего положения

Случай, когда тело в начальный момент времени не находилось на ближайшем расстоянии,



включает в рассмотрение множитель, связанный с углом  $\Theta$  между осью  $x$  и направлением на тело. Из рисунка видно, что  $Vt \sin \Theta = ct \sin \alpha$ . Отсюда

$$V = \frac{c \sin \alpha}{\sin \Theta}$$

Очевидно, что относительно скорости  $V \sin \Theta$  все предыдущие рассуждения будут верны.

## Замедление времени и сокращение размеров


Рассматриваемый случай наблюдения движущегося тела позволяет очень просто интерпретировать следствия СТО, заключающиеся в сокращении продольных размеров тел и замедлении времени. Из рисунка ниже ясно, что наблюдатель, находящийся в начале системы координат не может верно оценить всё перемещение движущегося тела, сделанное им за время  $t$ . Он может видеть проекцию этого перемещения, обозначенную на рисунке пунктиром. Так он наблюдает кажущийся, мнимый путь тела  $l' = Vt'$  вместо реального пути  $l = Vt$ . Отсюда мы имеем как бы “сокращение продольного размера”

$$l' = l \cos \alpha = l \sqrt{1 - V^2/c^2} \quad (7)$$

и после сокращение  $V$  – “замедление времени”

$$t' = t \sqrt{1 - V^2/c^2} \quad (8)$$

Таким образом, наблюдателю в неподвижной системе отсчёта кажется, что время движения тела составляет  $t'$ . Такое время показали бы его часы. Также он, принимая это время за истинное время движения, считает, что время  $t$ , которое он считает принадлежащим движущейся системе отсчёта, замедлилось по сравнению с его временем. Часы в движущейся системе отсчёта, он считает, отстают, показывая большее время, чем его часы. Именно эти расчётные показания часов неподвижный наблюдатель, придерживающийся СТО, считает т.н. собственным временем. Они как бы замедляются.



## Модель 4D материи

Описание, которое дано выше, производилось в таком же пространстве и времени, что и в СТО. Поэтому значение его не может быть другим – это преобразование абстрактного евклидова пространства  $R^4$ , появляющегося после прикрепления времени, пространства  $R^1$ , к пространству  $R^3$ . Умножив время на постоянную величину скорости света, мы изменили лишь масштаб и привели размерность к размерности длины. Метрика такого пространства положительно определена. Пространство Минковского  $R_1^3$  имеет другую структуру. Оно представляет собой псевдоевклидово пространство со знакопеременной метрикой. В нём вместо ортогонального преобразования появляется гиперболическое, в


котором вместо обычных тригонометрических функций используются гиперболические, но по сути ничего нового в данном представлении казалось бы, не может возникнуть — не считая его косоугольность.

Однако физический смысл обрисованной выше картине может быть придан, если вместо пространства и времени был бы рассмотрен некий физический объект, а пространство и время использовались бы по их прямому назначению — для обозначения положения физических тел и для обозначения движения физических тел.

Таким объектом не может быть эфир, который претендует на роль светоносной среды во множестве теорий. Во-первых, это трёхмерная конструкция. Во-вторых, свет, который в такой среде мог бы распространяться, был бы обязательно связан с продольными колебаниями частиц такой среды в то время, как известно со времен опытов Герца, свет представляет собой поперечные колебания. В-третьих, многочисленные попытки обнаружить эфир следует признать безуспешными. Мы можем указать на другой объект в пространстве

$R^4$ . Он должен вести себя также как вектор  $ct$  на представленных рисунках. В трёхмерном пространстве  $R^3$  материальное тело можно в ряде случаев заменить т.н. материальной точкой, чтобы изучить движение тела. В пространстве  $R^4$  подобным объектом должен быть размерностью на единицу выше. Это должен быть некий линейный объект, движущийся плоско-параллельно со скоростью  $V$  в направлении оси  $x$ . Он по своим свойствам должен в определённой степени представлять тело, частицу, которую мы можем наблюдать в Мире.


На рисунке показано поперечное сечение пространства  $R^4$ . На нём предполагается, что 4D материя занимает полупространство в положительном направлении оси  $x_4$ . Горизонтальная красная линия означает часть трёхмерной границы 4D материи, гиперповерхности. Свет может распространяться лишь по этой гиперповерхности и представляет собой некие её поперечные колебания. Красная пунктирная линия представляет искомый линейный объект в первоначальном положении, сплошной красной линией он обозначен в момент времени  $t$ . Мы дали название 4-вихря этому объекту с таким свойством.



Предполагается, что он является аналогом трёхмерной вихревой структуры, водоворота. Из построения следует, что кроме вращательного движения 4D материи вдоль его оси также происходит движение со скоростью света. При определённых условиях, когда, например, имеется система 4-вихрей, атом, может произойти испускание фотона. Водоворот будет стоять на месте, если его тело будет расположено по нормали к границе воды. В этом случае кривизна границы будет симметричной относительно оси вихря. При наклоне вихря

симметрия его границы нарушится и силы поверхностного натяжения начнут сдвигать его в сторону, где симметрия была бы восстановлена, т.е. в сторону наклона.

В случае 4-вихря мы имеем дело с кривизной не двумерной поверхности, а трёхмерной гиперповерхности, нарушение симметрии которой также вызывает движение всего вихря. На рисунке изображены некоторые геодезические, образующие 4-вихря в состоянии покоя. Возможным является лишь регистрация положения его горловины, его положения в 3D Мире.




## Сложение скоростей

Формула сложения скоростей, получаемая в СТО, всегда вызывает легкое недоумение. По ней получается в частности, что если одна из скоростей  $V$  или  $U$  равна скорости света, то общая скорость  $v'$  тоже будет равной скорости света, какой бы не была другая скорость

$$v' = \frac{V+U}{1 + \frac{VU}{c^2}} \quad (9)$$


В представлении, которое дано здесь, получится другая формула. Она уже была получена [3], [4]. Пусть относительно тела, движущегося со скоростью  $V$ , в том же направлении движется другое тело со скоростью  $U$ . Это значит, что в ИСО, связанной с первым телом, которое обозначено на рисунке синим цветом и которое имеет наклон  $\alpha$ , есть тело, обозначенное красным цветом и имеющее наклон относительно 4-вихря первого тела  $\beta$ . Очевидно, что относительно исходной ИСО угол наклона составит сумму этих углов.



Поэтому общая скорость, согласно определению (1), равна


$$V' = c \sin(\alpha + \beta) = c(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = V \sqrt{1 - U^2/c^2} + U \sqrt{1 - V^2/c^2} \quad (10)$$

Будем называть эту формулу по имени Р. ван Линдена, который впервые её предложил. Мы можем развернуть картинку на угол  $\alpha$ , чтобы увидеть, что для второго тела получилась ситуация, аналогичная первому и что его угол наклона в исходной ИСО равен  $y = \alpha + \beta$ . В этом действии, на наш взгляд, отражается принцип относительности Эйнштейна. Рассмотрение движения тел происходит не относительно гиперповерхности Вселенной, а относительно воображаемой, соответствующей выбранной ИСО. Относительно её можно проделать все операции, которые были сделаны выше, чтобы получить ПЛ. При этом надо, конечно, иметь в виду, что угол  $y$  не может быть больше  $\pi/2$ .



Чтобы сравнить выражения (9) и (10) мы изобразим эти две функции при  $c=1$  для различных значений одной из скоростей  $V$  или  $U$ . Значения второй функции отмечено положением бегунка. Из графиков видно, что при нулевом значении они сливаются, при малых значениях почти не отличаются. Различие в том, что первая функция, изображенная синим цветом, неограничена. Вторая функция красного цвета, как и должна по условию (1) не превышать по модулю единицу. Она представляет собой половину эллипса. Из всех значений, однако, надо вычесть те, которые находятся за пределами максимума красной функции, т. е. когда угол  $y$  достигает значения  $\pi/2$ . Последний график отражает ситуацию, при которой одна из скоростей равна единице. Вторая скорость останется равной нулю и поэтому суммарная скорость, как и в СТО, будет равной единице.


Таким образом, отличием выражений (9) и (10) является также то, что первая формально допускает сложение каких угодно скоростей, получая при этом скорости не превышающие скорость света лишь при выполнении постулата СТО о предельной скорости. Вторая формула ограничивает слагаемые скоростью света, т. к. иначе превышение делает сумму скоростей мнимой.



## Опыт Физо


Опыт Физо создатель СТО А. Эйнштейн считал решающим экспериментом в поддержку теории относительности [9]. Однако хотя эта теория на основе формулы сложения скоростей (9) давала, казалось бы, верный результат для установленного на этом опыте коэффициента увлечения Френеля, появились новые данные, которые гораздо лучше описывали опыта

Физо [8], [9] на основе классического эффекта Доплера. Вместе с тем, этот эксперимент даёт возможность проверить формулу ван Линдена для сложения скоростей. Поэтому рассмотрим подробнее этот эксперимент. Его схема представлена ниже.



Вода прогоняется по двум трубам. FM — это измеритель скорости потока. Свет лазера с помощью зеркал M1, M2, M3 и M4 направляется вдоль труб через BS — полупрозрачное стекло, которое расщепляет свет на два пучка. Камерой фиксируется интерференция этих двух пучков.

Результаты опыта представлены на графике.



Красная линия соответствует классической формуле сложения, которая следует из принципа относительности Галилея:  $v' = V + U = V + \frac{c}{n}$ , где  $n$  — показатель преломления воды. В этом случае интерференционный сдвиг выражается формулой [8]:

$$FS_N = 1.16 \frac{2Lvn^2}{\lambda c} \quad (11)$$


Здесь  $L$  — длина труб,  $v$  — разность скоростей воды в трубах,  $\lambda$  — длина волн лазера.

Численный коэффициент 1.16 выражает отношение максимальной скорости воды к средней в данном эксперименте.

Синяя линия представляет случай СТО, выражаемой формулой (9), которая в случае  $v/c \ll 1$  принимает вид  $v' = v(1 - \frac{1}{n^2}) + \frac{c}{n}$ . Выражение в скобках носит название

коэффициента увлечения Френеля в соответствии с гипотезой Френеля, по которой светоносный эфир частично увлекается движущейся материей. Выражение для сдвига приобретает вид

$$FS_{SR} = 1.16 \frac{2Lvn^2}{\lambda c} \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right) \quad (12)$$



Жирной оранжевой линией показано положение, соответствующее формуле ван Линдена (10), которая в этом случае примет вид  $v' = \frac{c}{n} + V \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}$ . Сдвиг при этом равен

$$FS_{VL} = 1.16 \frac{2Lvn^2}{\lambda c} \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \quad (13)$$

Мы видим, что формулы (9) и (10) почти одинаково неплохо описывают опытные данные. Однако наилучшее совпадение с опытными данными имеет метод на основе первостепенной значимости эффекта Доплера, который предложен авторами работ [8] и [9]. Сдвиг по их расчётам равен

$$FS_D = 1.16 \frac{2Lvn}{\lambda c} \quad (14)$$

Наклоны графиков имеют следующие значения:

Теория	Наклон
Ньютон	0.0784
СТО	0.0343
Ван Линден	0.0518
Майэрс, Вейн	0.0441
Эксперимент	$0.0419 \pm 0.0006$

## Энергия 4-вихря

Рассмотрим наиболее простую форму 4-вихря, в котором есть только два движения 4D материи – вращение вокруг оси вихря и движение вдоль оси со скоростью света. Траекторию точки 4D материи в таком случае можно представить в виде вектора

$$x = \begin{pmatrix} R \cos \phi \\ R \sin \phi \\ 0 \\ ct \end{pmatrix} \quad (15)$$

Это семейство спиралей, винтовых линий, получаемое при разных значениях радиусов  $R$  и углов  $\phi$ . Поле скоростей получится дифференцированием, считая  $R$  независимым от времени

$$u = \begin{pmatrix} -R \dot{\phi} \sin \phi \\ R \dot{\phi} \cos \phi \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \quad (16)$$

Вычислим квадрат скорости  $u^2 = (R \dot{\phi})^2 + c^2$ . Тогда общая кинетическая энергия такого 4-вихря получится интегрированием по дополнительному измерению.  $L_0$  – это “длина частицы” в дополнительном измерении, расстояние вдоль  $x_4$ , на котором скорость исчезает,  $k_1$  – коэффициент пропорциональности.

$$E = \frac{k_1}{2} \int dx_4 u^2 = \frac{k_1 L_0}{2} (R^2 \dot{\phi}^2 + c^2) \quad (17)$$

Если принять  $R \dot{\phi}$  равным скорости света, что, как показано ниже, имеет определённый смысл, мы получим уравнение для энергии покоя  $E_0 = m_0 c^2$ . Масса покоя  $m_0$  оказывается пропорциональной длине частицы,  $m_0 = k_1 L_0$ .

Когда 4-вихрь каким-либо способом получает наклон по отношению к нормали, восстановленной от гиперповерхности, он растягивается, его длина увеличивается

$$L = \frac{L_0}{\cos \alpha} \quad (18)$$

Таким образом, мы получим знаменитое уравнение для энергии частицы

$$E=mc^2 \quad (19)$$

в котором  $m=\frac{m_0}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$  - т.н. *релятивистская масса*. С другой стороны, как это сейчас принято [5], можно считать массу постоянной, равной  $m_0$ , а энергию прямо зависящей от скорости  $E=\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ . В этом случае, однако, массе станет невозможным придать какой-либо геометрический смысл. При малых скоростях по сравнению со скоростью света мы имеем классическое значение кинетической энергии и энергии покоя  $E=m_0 c^2+m_0 V^2/2$ . Альтернативно можно записать эту же формулу в виде  $m=m_0+m_0 V^2/2c^2$ . Из этих формул следует, что масса приростает за счёт кинетической энергии.

## Волны де Броиля

Решение уравнения  $R\dot{\phi}=c$  имеет вид

$$\phi=\frac{ct}{R}+C \quad (20)$$

Постоянную интегрирования С можно положить равной нулю. За один период  $t=T$  угол  $\phi$  изменится на  $2\pi$ . Отсюда имеем  $R=\frac{c}{\omega}$ , где циклическая частота  $\omega=2\pi/T$ . При этом предположим, что за этот период движение 4D материи вдоль оси 4-вихря происходит на расстоянии, равном комптоновской длине волны  $\lambda_c$ :  $\lambda_c=cT$ . Тогда при продвижении 4-вихря эта комптоновская волна разворачивается в де Броильевскую волну на гиперповерхности так, как это показано на рисунке ниже.


$$\lambda_{dB}=\frac{cT}{\sin \alpha}=c^2 \frac{T}{V}=\frac{h}{p} \quad (21)$$

Постоянная Планка  $h$  определяется при этом как

$$h=mc^2 T=ET \quad (22)$$

Таким образом, энергия волны де Броиля равна  $E=h\nu$ , где частота  $\nu=1/T$ . Модуль импульса определяется почти как в классической механике

$$p=mV=\frac{m_0}{\cos \alpha}c \sin \alpha=m_0 c \operatorname{tg} \alpha \quad (23)$$




## Обсуждение

Конечно, предложенный вариант вывода ПЛ, хоть и является на наш взгляд простейшим, не идеален. Ось  $x'$  движущейся ИСО не может быть повернута. Её направление по условию должно совпадать с направлением оси  $x$  покоящейся ИСО. Однако, простота, с которой получаются ПЛ, требует объяснения. Пытаясь понять суть поворота на угол  $\alpha$  при ПЛ, мы неизбежно приходим к мысли о четвёртом измерении. При этом мы должны принять во внимание, что поворот в четырёхмерном пространстве происходит не вокруг одной оси, как в трёхмерном Мире, а “вокруг двумерной плоскости”. Поэтому кажется естественным предположить, что, если ПЛ имеют отношение к реальному процессу, то поворот при ПЛ должен происходить с участием четвертого измерения. При этом если это пространство-время, то поворот должен произойти в плоскости, включающей временную ось. Если это 4D материя, то поворот в плоскости  $(x_1, x_4)$ , как это предложено выше.

В первом случае пространства-времени, однако, поворот приобретает абстрактный, чисто математический характер и ПЛ - смысл пассивного преобразования координат, при котором положение всех векторов остаётся неизменным. Изменилось положение осей системы координат и вектора получили новые значения координат, но их модули и их положения остались неизменными. Во втором случае 4-вихрь, представляя собой замену трёхмерного тела в обычном трёхмерном представлении, получает реальный наклон относительно гиперповерхности. Пространство при этом остаётся без изменения. Такое преобразование является активным. Именно оно соответствует движению тела, выраженного в классической механике преобразованием Галилея  $x' = x + Vt$ . В предложенной картине движение 4-вихря вдоль гиперповерхности Вселенной подчиняется именно этому закону. Кроме того, представление поворота даёт в этом случае для вектора  $H$  реальное, действительное, значение в отличие от интервала СТО, который может принимать и мнимые значения. ПЛ возникают, как это видно из всего рассмотрения, путём пассивного преобразования. В этом, на наш взгляд, заключается смысл принципа относительности теории относительности, когда вместо активного предлагается пассивное преобразование.

Понятие события, используемого в СТО, в данной трактовке приобретает иное значение. Это также набор величин  $(x, t)$ , как и в СТО. Только это не такое довольно абстрактное событие, как вспыхивание света в точке  $x$  и в момент  $t$ . Так понимаемое событие никак не связано с существованием движущейся системы отсчёта, хотя цель именно в том, чтобы получить формулы пересчёта координат события в одной системе отсчёта для другой системы. Мы предлагаем рассмотреть такую несложную ситуацию.

В начале системы отсчёта находится движущееся со скоростью  $V$  тело в направлении оси  $x$ . Спрашивается, каким будет расстояние до точки на этой оси за время  $t$  в



ИСО, связанной с движущимся телом. Из рисунка видно, что построение, которое надо сделать, чтобы прийти к ПЛ тем же способом, что был вначале, очевидно. Надо лишь построить вектор  $c$ , восстановить на нём перпендикуляры.

В предложенном варианте вывода ПЛ знаменитые эффекты продольного сжатия размеров и замедления времени имеют мнимый, кажущийся характер, возникающий из-за геометрии наблюдения. Поэтому все парадоксы, такие как парадокс близнецов, могут быть разрешены простейшим образом. Нет реального замедления времени в движущейся ИСО. Покоящийся наблюдатель может лишь мысленно представить, что этот эффект имеет место. Замедление времени, якобы наблюданное при регистрации космических мюонов и в других экспериментах, возможно, связаны с увеличением времени жизни частиц, которое получается в движении. Со скоростью меняется длина частицы — меняется и время её распада, если она нестабильная. Масса частиц по этой же причине получается зависящей от скорости.

Проверка предложенной формулы для сложения скоростей могла бы быть проверкой всей предложенной концепции 4D материи. Однако отличия от формулы СТО сказываются лишь при достаточно больших скоростях. Опыт Физо не даёт полной уверенности в справедливости предлагаемой модели.

Сам принцип относительности легко трактуется в рамках модели 4D материи. Он заключается с этой точки зрения в невозможности установить истинное положение границы 4D Вселенной, граничной гиперповерхности. Поэтому можно так переформулировать этот принцип:

- Никаким методом невозможно установить истинное положение границы Вселенной.

В рамках модели 4D материи это положение легко объясняется. Движение тела в нашем трёхмерном Мире — это лишь видимая часть перемещения четырёхмерного вихря вдоль границы Вселенной. Такое движение является инерционным. Это значит, что вихрь, не подверженный влиянию других вихрей, сохраняет своё поле скоростей той 4D материи, которой он окружён и из которой он состоит, что является следствием того, что вихревое движение “вморожено” в поле скоростей 4D материи. Этот вывод математически выражается в виде уравнения [6]

$$\dot{F} + L_u F = 0 \quad (24)$$

где  $L_u$  — производная Ли относительно поля скоростей  $u$ ,  $F$  — тензор т.н. *внутреннего электромагнитного поля*, определяемого как четырёхмерная завихрённость поля скоростей:

$$F_{ij} = \partial_i u_j - \partial_j u_i . \quad (25)$$

Поэтому любая ИСО со своим телом отсчёта выглядит так, как будто это тело находится в покое относительно Вселенной в то время, как она имеет наклон на некий угол  $\alpha_0$ . При этом скорость света в ней не равна истинной скорости света, которой обладает реальная гиперповерхность,

$$c_{rf} = c \cos \alpha_0$$

Поэтому вопреки утверждению СТО скорость света не является инвариантной относительно переходов из одной ИСО к другой. Она кажется инвариантной наблюдателю, находящемуся неподвижным в одной из ИСО. Действительно, поскольку расстояния и времена в движущейся ИСО ему кажутся в соответствии с (7) и (8) уменьшенными на один и

тот же множитель  $\cos \alpha_0$ , то скорость света, являющаяся отношением этих величин, тоже будет постоянной. Это утверждение справедливо как для продольных расстояний, расстояний вдоль движения, так и для поперечных [7]. Относительность в этом представлении означает невозможность установить значение  $\alpha_0$ . Поэтому в формулах ПЛ вместо скорости света, принимающей предельное значение на гиперповерхности Вселенной, следует понимать скорость  $c_{rf}$ . Но вместе с тем, ПЛ дают нам ключ к определению истинной скорости света, которой обладает граница Вселенной, если во-первых, мы научимся определять значение угла  $\alpha_0$  такая граница действительно существует и если, во-вторых, такая граница действительно существует. В этом смысле мы бы получили доступ к некой абсолютной системе отсчёта, связанной с таким телом отсчёта как наша Вселенная. В этом случае ПЛ следовало бы применить для перехода между той условно ИСО, в которой мы находимся и этой АСО. Это бы означало преодоление принципа относительности в предложенной формулировке.

То, что опытные данные не противоречат формулировке второго постулата СТО, может также указывать на то, что угол  $\alpha_0$  мал для Млечного пути и что наша Галактика поэтому находится в неком привилегированном положении во Вселенной.

## Благодарности

Благодарю Д.В.Перегудова за полезное обсуждение.

- [1] Малыкин Г.Б. Паралоренцовы преобразования. УФН, 179, 285 (2009)
- [2] Скоробогатов В.П. Природа преобразований Лоренца. Сайт автора,  
<http://vps137.narod.ru/phys/article20.pdf> (2012)
- [3] Van Linden R. Dimensions in special relativity theory (2005)  
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.5602&rep=rep1&type=pdf>
- [4] Скоробогатов В.П. Системы отсчёта в 4D- модели эфира . Сайт автора.  
<http://vps137.narod.ru/phys/article6.pdf> (2007)
- [5] Окунь Л.Б, Формула Эйнштейна. «Не смеется ли Господь Бог»? УФН, 178, 541 (2008)
- [6] Скоробогатов В.П. Электродинамика в модели 4D материи.  
<http://vixra.org/abs/1312.0189> (2013)
- [7] Скоробогатов В.П. The meaning of the postulates of the special relativity.  
<http://vixra.org/abs/1611.0318> (2016)
- [8] Maers A.F. et al. The african review of physics. 8:0043 (2013)  
Errata corrigendum. [labs.plantbio.cornell.edu/wayne/pdfs/errata.pdf](http://labs.plantbio.cornell.edu/wayne/pdfs/errata.pdf)
- [9] Maers A.F. Wayne R. The african review of physics. 5, 7 (2011)
- [10] Maers A.F. et al. <http://labs.plantbio.cornell.edu/wayne/pdfs/errata.pdf>